

市口腔医院提醒： 儿童牙齿矫正黄金时机别错过



本报讯（最泰安全媒体记者 颜凯 通讯员 诸葛南山）再好的矫正技术都只是弥补牙齿自身的不足，市口腔医院口腔正畸医生提醒家长和孩子，平时多注意就能减少牙齿矫正的概率。

医生提醒，家长要纠正孩子不良习惯，让孩子少吃甜食，发现孩子有吃手指、咬嘴唇、吐舌头等不良习惯，须及时提醒，耐心教育；合理喂养，提倡母乳喂养，避免“奶瓶龋”的出现，采用人工喂养时，最好能使用近似乳头的奶嘴，奶嘴的开孔不可过大，直径以1至2毫米为佳；加强对孩子的咀嚼功能训练，充分锻炼孩子口腔肌肉功能，有效刺激孩子下颌骨的生长发育；护理好孩子乳牙，乳牙龋坏脱落最易导致恒牙发育错颌畸形，乳牙排列是恒牙列排列的先导，乳牙缺失会导致两侧牙齿向空隙挤压，导致牙列不齐，遇到此类问题需要马上进行矫正。

家长一旦发现孩子牙齿畸形，别错过牙齿矫正的好时机，不同的畸形类型，最佳矫治时机也不同。一般来说，临床儿童常见的颌面畸形可分为两类：牙性畸形和骨性畸形。而牙性畸形又分为一般的牙性畸形和功能性畸形。口腔医生会根据儿童检查报告作出判断，为其选择最佳的矫治时机。

一般的牙性畸形最佳矫治时机是恒牙列早期（即12至13岁），这时儿童刚换完牙，并且处于生长发育比较旺盛的时候。功能性畸形由于常出现在替牙列期（即6至12岁），如果推迟矫治，便有可能发展成骨性畸形，因此最佳矫正时期应在替牙列期，即6至12岁。骨性畸形矫正应在儿童处于生长发育高峰前期进行矫治（女孩10至12岁，男孩11至13岁）。地包天前牙反咬合，俗称“地包天”。这种畸形对儿童的颌骨发育有比较严重的影响，一旦发生应立即矫正，最早的矫正可以在孩子3岁半左右开始进行，通常只需要3至6个月的时间，就可以将反咬在下颌牙齿内侧的乳上前牙推移出来。

如果已经错过了以上儿童矫正时期，18岁以后还可以进行成人正畸，市口腔医院会根据牙齿畸形患者的不同类型和个体的生长发育情况而定。不过，对于不少因牙齿引起面部畸形的患者来说，及时获得治疗可起到事半功倍的效果。

新泰市举办新生儿复苏技能竞赛 30余名医务人员参赛



本报讯（最泰安全媒体记者 王磊 通讯员 于梅）为深入实施母婴安全行动计划，提升新生儿救治能力，降低新生儿出生窒息的发生率和死亡率，根据新泰市卫生健康局、新泰市总工会《新生儿复苏技能竞赛活动方案》要求，受新泰市卫生健康局、新泰市总工会的委托，新泰市妇幼保健计划生育服务中心于7月12日成功举办了“新泰市2022年新生儿复苏技能竞赛”。

本次竞赛特邀请上级专家担任评委，新泰市各医疗机构共选派30余名医务人员参加。本次竞赛分笔试和技能操作两个环节，通过紧张、有序的比赛，根据综合笔试成绩和技能操作成绩，共评出团体一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名；个人特等奖1名、一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名。

此次技能竞赛形成比学赶超的浓厚氛围，有效提高了新泰市助产机构新生儿复苏救治水平，为全力保障母婴安全夯实了基础。

宁阳县第二人民医院开展党员义诊活动 红色七月“医”路同行



本报讯（最泰安全媒体记者 王磊 陶明星）近日，宁阳县第二人民医院开展“喜迎二十大，奋战新征程，共筑健康梦”党员志愿者义诊活动。此次活动中，医院组织了心内科、神经外科、康复医学科、肛肠科等学科专家到“县派第一书记村”——金家岭村为群众送医送健康。

活动当天，前来接受检查和治疗的村民早早来到金家岭村村委。医护人员认真询问村民身体健康状况，耐心细致地为其开展身体检查和病情分析。针对村民提出的各种健康问题，医护人员一一详细解答，并给予合理的治疗方案。

近段时间，宁阳县第二人民医院开展了一系列义诊活动，为广大群众提供便捷优质高效的诊疗服务，以满足人民群众的就医和保健需求，提高广大群众自我保健意识和健康水平。

宁阳县第一人民医院多科室合力救治患者 意外车祸命悬一线 被救治后转危为安

本报讯（最泰安全媒体记者 王磊 通讯员 李峰）近日，李先生（化名）因意外车祸导致严重受伤，昏迷不醒，随后李先生被紧急送往宁阳县第一人民医院抢救。经过重症医学科、神经外科和麻醉科多科室联合抢救，李先生最终转危为安。

据了解，李先生被送到急诊室后，医生立刻评估了病情，建立了静脉通路，进行了脑CT检查，结果显示李先生左侧硬膜下出血、创伤性硬膜外出血、创伤性蛛网膜下腔出血、颞骨骨折（头部两侧）、顶骨骨折（头顶顶部）、皮下血肿。除此之外，李先生身体还有多处挫伤，医生初步诊断其为闭合性颅脑损伤重型等，情况十分危急，便将其转入重症医学科抢救治疗。

次日凌晨，李先生意识障碍突然加重，医生立刻对其采取降颅压、减轻脑水肿治疗等措施，同时复查颅脑CT，结果显示患者左侧硬膜下、硬膜外出血较之前有所增加，需要实施紧急开颅手术。重症医学科立即联系了神经外科进行会诊，在制定手术方案的同时对李先生进行术前检查，排除了各项手术禁忌后，李先生被推进了手术室。神经外科副主任颜进项带领神

经外科团队在手术室和麻醉科的配合下为李先生实施了左侧去骨瓣减压术+硬膜下血肿清除术。经过近3个小时的抢救，手术顺利结束。术后，李先生各项体征趋于平稳，返回重症监护室继续观察治疗。

经过多日的治疗，李先生的病情恢复良好，转出重症监护室，前往普通病房观察。为表达对医护人员的感谢，李先生在出院前特意定制了两面锦旗送到了颜进项和重症医学科团队的手中。

颜进项表示，外伤引起的颅内出血是由外伤引起的脑血管损伤导致的。这将会造成患者颅内压升

高，出现头痛和呕吐症状，以及出现因脑组织和脑功能损害而引发的头晕症状。出血会对患者周围的脑组织造成压迫，肢体功能产生障碍甚至瘫痪。患者出血较多时应及时进行手术治疗。对于猛烈撞击或颠簸造成的颅内出血，颅骨碎片可能会穿透患者脑组织，导致慢性出血。部分患者可能会有迟发性出血的表现，即受伤初期可能没有临床表现，只是感觉头晕，在第二、三天突然出现呕吐、意识丧失和昏迷等症状。因此，头部外伤后，患者及其家属应引起重视，受伤后需进行一段时间医学观察。